

Mode d'emploi – Fumagilin-B

Quand traiter

- Faire le traitement **au printemps** (au redémarrage de la colonie) et / ou à **l'automne, après la récolte du miel**.
- Éviter pendant les fortes miellées ou en présence de hausses destinées à la consommation humaine.

Préparation de la solution

- Dissoudre 1 bouteille de Fumagilin-B (**2g** de principe actif) dans **20 litres de sirop 2:1** ou 1:1 (2-1 part sucre / 1 part eau).
- Bien mélanger jusqu'à dissolution complète (utiliser de l'eau tiède, pas chaude).
- Laisser refroidir avant de donner aux abeilles.

Administration

- Distribuer environ **250ml à 500ml de sirop médicamenteux par colonie** à la fois, jusqu'à ce que chaque ruche ait reçu **4 litres environ au total**.
- Donner **dans un nourrisseur propre**, jamais par pulvérisation.
- S'assurer que les abeilles consomment tout le sirop (éviter qu'il fermente).

Précautions

- Ne pas utiliser pendant la période de production de miel destiné à la consommation.
- Porter **gants** et **lunettes** lors de la préparation.
- Conserver le produit **au réfrigérateur et à l'abri de la lumière**.
- Jeter toute solution non utilisée après 1 semaine.

How to Use Fumagilin-B

When to Treat

- Apply the treatment in **spring** (when colonies start building up) and/or in **fall, after honey harvest**.
- Avoid using it during nectar flows or when honey supers for human consumption are on the hive.

Preparing the Solution

- Dissolve 1 bottle of Fumagilin-B (**2g** active ingredient) in **20 liters of sugar syrup 2:1** or 1:1 (2-1 part sugar / 1 part water).
- Stir thoroughly until completely dissolved (use warm—not hot—water).
- Let the solution cool before feeding the bees.

Feeding the Colonies

- Feed about **250–500ml of medicated syrup per colony** at a time until each hive receives roughly **4 liters in total**.
- Provide the syrup **in a clean feeder**, never by spraying.
- Make sure the bees consume all the syrup to prevent fermentation.

Safety Precautions

- Do not use during honey production for human consumption.
- Wear **gloves** and **safety glasses** when mixing the solution.
- Store the product **in the refrigerator**, away from light.
- Discard any unused syrup after one week.