

Calendrier Apicole

Mois de l'année	Ponte	Dans la ruche	Ce que fait l'apiculteur	Précautions !	Floraisons	Mois de l'année	
Janvier		Abeilles grappées, c'est l'hiver.	Laisser la ruche tranquille, ne pas déneiger.			Janvier	
Février				Soupeser la ruche pour évaluer la consommation de la nourriture		Février	
Mars	Augmentation de la ponte	Vol de propreté, beaucoup d'abeilles d'hiver vont mourir = normal - Développement du couvain des abeilles d'été, naissance des faux-bourdons	Après le vol de propreté, insérer une galette de protéines (stimulation de la ponte)	S'assurer que le couvain est bien protégé des courants d'air. Remettre le tiroir (si plateau grillagé) et le réducteur d'entrée.		Mars	
Avril			Stimulation au sirop de printemps si nécessaire, dépistage et traitement doux contre les varroas	Si nectar insuffisant dans la nature, mettre nourrisseur Boardman (simulation de la miellée). S'assurer de faire le premier traitement contre les varroas avant la sortie du pissenlit.	Érable & Aulnes	Avril	
Mai		Fièvre de l'essaimage possible, attention!	Première inspection, enlever graduellement l'isolation, nettoyage du plateau	Pour inspecter, la température doit être plus élevée que 15C avec soleil. Pour enlever l'isolation, juger avec la température extérieure selon votre région. 3 nuits en haut de 10C est un bon guide.	Pissenlit & Arbres fruitiers	Mai	
Juin						Tilleul & Trèfle	Juin
Juillet	Diminution de la ponte	Récolte de nectar, pollen, eau et propolis selon les besoins de la colonie (avril à septembre)	Pose de hausses à miel fréquente - Extraction optionnelle - dépistage (début juillet) - traitement si nécessaire	Équilibre entre ne pas trop attendre et ne pas aller trop vite. Mettre la hausse à miel vide en-dessous de celle qui est pleine. Possibilité d'extraire souvent ou une fois en fin de saison. Utiliser le chasse-abeilles en mettant de l'espace pour éviter congestion.		Juillet	
Août				Attention au pillage !! Fente d'aération de l'entretoit à mettre à l'envers + mettre le réducteur d'entrée au minimum. Dépistage et traitement contre la Varroase à faire, très important ! Nourrissement = 20 litres de sirop d'automne (2:1)	Chardon & Aster	Août	
Septembre		Rejet des faux-bourdons, colonie au maximum de ses provisions, abeilles très protectrices	Dernière extraction possible (1ere sem.) - Installation du nourrisseur - Traitement contre les varroas		Surveiller encore le pillage. Maintenir en place le réducteur d'entrée.	Hydrangée & Verge d'or	Septembre
Octobre				Dernière dose de sirop d'automne			Octobre
Novembre			Traitement complémentaire d'acide oxalique, vérification du matériel en entreposage	La température doit être entre 2C et 10C. Pour l'entreposage, s'assurer que les souris ne peuvent pas faire leur nid dans une hausse vide et que l'aération est suffisante. Profitez-en pour faire votre inventaire, ce qui a servi ou non, nettoyage/réparation si nécessaire.		Novembre	
Décembre		La colonie se grappe doucement pour l'hiver	Partez en vacances !	Quand l'hiver est bien pris, enlever le réducteur d'entrée.		Décembre	

Inspection de la ruche à tous les 15 jours, partielle ou complète selon circonstances